

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора

И.А. ВЛАСОВ

28.05.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Цигро (Cygro)

(организация-разработчик: «Zoetis Inc», 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, USA)

Номер регистрационного удостоверения:

840-3-9.19-4475 НПВЧ-3-519/00204

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Цигро (Cygro).

Международное непатентованное наименование: мадурамицин.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Цигро в 1000 г содержит в качестве действующего вещества мадурамицина аммония – 10 г, а в качестве вспомогательных веществ бензиловый спирт и размолотую сердцевину початка кукурузы.

3. По внешнему виду препарат представляет собой микрогранулированный сыпучий порошок светло-коричневого цвета, не образующий пыли и не растворимый в воде.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после вскрытия упаковки – 3 месяца. Запрещается применять Цигро по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 20 кг в герметично закрытых крафт-мешках.

5. Хранят и транспортируют Цигро в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Цигро следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: противокочидийный лекарственный препарат группы ионофорных антибиотиков.

10. Мадурамицин аммония, входящий в состав препарата, обладает широким спектром действия в отношении основных видов кокцидий, паразитирующих у птиц (*E. necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*), в стадии спорозонта, трофозонта, шизонта первой генерации.

Механизм действия препарата заключается в избирательном нарушении транспорта ионов Na^+ и K^+ через биологические мембраны клетки паразита, что приводит к нарушению осмотического баланса и гибели кокцидий.

Мадурамицин аммония практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает свое действие на слизистой и подслизистой оболочках. Выводится из организма птиц, главным образом, в неизменном виде с пометом в течение 2-3 дней.

Цигро по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Цигро назначают цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур с целью профилактики кокцидиоза.

12. Запрещается применение лекарственного препарата племенной птице, курам-несушкам, яйца которых используют в пищевых целях, ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста и животным других видов.

13. Все работы с Цигро необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Цигро. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей. Упаковочный материал складировать в специально отведенных местах и утилизировать с бытовыми отходами.

14. Препарат не предназначен для применения курам-несушкам и племенной птице.

15. Цигро применяют в соответствии со стандартными схемами ротационной или челночной программ, принятыми в хозяйстве.

Препарат вводят в рацион птиц в дозе 500 г на 1 тонну корма, что соответствует 5 мг мадурамицина аммония (действующего вещества) на 1 кг массы корма, и применяют:

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключают из рациона за 5 дней до убоя;
- ремонтному молодняку кур с первого дня жизни до 16-недельного возраста.

Для обеспечения равномерного распределения лекарственного препарата в корме используют ступенчатое смешивание. С этой целью рекомендуемую дозу препарата (500 г/т) смешивают с 10 кг комбикорма, затем смесь перемешивают с 90

кг комбикорма и при тщательном перемешивании вносят в оставшееся количество (900 кг) комбикорма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Не допускается использование Цигро одновременно с другими антикокцидийными средствами, совместно с тиамулином, а также за 7 дней до и в течение 7 дней после окончания его применения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения Цигро, так как это может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной дозы лекарственного препарата его применение возобновляют как можно скорее в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Цигро. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

«Пуян Хотвей Фармасьютикалс
Лимитед», Вест Шенгли Роуд, Пуян,
457 000 провинция Хэнань, КНР/
«Puyang Hotway Pharmaceuticals Limited»,
West Shengli Road, Puyang, 457 000 Henan
Province, Republic of China.

Наименование и адрес
производителя фармацевтической
субстанции

«Пуян Хотвей Фармасьютикалс
Лимитед», Вест Шенгли Роуд, Пуян,
457 000 провинция Хэнань, КНР/
«Puyang Hotway Pharmaceuticals Limited»,
West Shengli Road, Puyang, 457 000 Henan
Province, Republic of China.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Зоэтикс», РФ, 123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10, блок С.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Цигро, утверждённая Россельхознадзором 20 июня 2014 года.